

СЛАБИТЕЛЬНОЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СЕНАДЕ®

DR. REDDY'S

РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ- ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

КОГДА НУЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ:

При запорах, вызванных гипотонией и вялой перистальтикой кишечника вследствие:

- малоподвижного образа жизни
- нарушений диеты, изменения режима питания
- нервного стресса
- приема лекарственных средств

Для регулирования стула при геморрое, проктите, анальных трещинах

КАК НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Возраст	Обычная доза	Максимальная доза
Взрослые	1 таб./сутки	2–3 таб./сутки
Дети старше 12 лет	1 таб./сутки	2–3 таб./сутки
Дети 6–12 лет	1/2 таб./сутки	1–2 таб./сутки

Если после достижения максимальной дозы в течение 3 дней дефекация не происходит, необходимо обратиться к врачу

КОГДА НАСТУПИТ ЭФФЕКТ:

Слабительное действие наступает через 8–10 часов после приема



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.